

INFORMATION OM HUVUDLÖSS

Det har förekommit fall av huvudlöss i skolan. För att förhindra spridning ber vi Er att kontrollera barnens hår och hårbotten extra noga de närmaste två veckorna.

Hur vet man att man fått huvudlöss?

- Har personer i den närmaste omgivningen huvudlöss är det en signal till ökad uppmärksamhet.
- Det kan vara svårt att identifiera levande löss och levande ägg i håret. Utkammade levande löss är det säkraste tecknet men även ömsade skinn (liknar lössen) är säkra tecken. Svart pulver (liknande finmalen peppar), på t.ex. huvudkudden, kan vara avföring från lössen. Undersök hela familjen.
- Det viktigaste instrumentet för diagnos är en finkam, som kan köpas på apotek. För att man lättare skall upptäcka de utkammade lössen, kan kamningen ske över ett vitt papper, en spegel eller liknande. Ett annat sätt är att fukta håret, vilket gör att lössen fastnar i kammen.

Behandling

Receptfria mediciner

Det vanligaste idag är Prioderm kutan lösning som kan användas av barn från 2 år. Preparatet rekommenderas som förstahandsmedel av Läkemedelsverket.

- Andrahandsmedel är Tenutex som kan användas av barn från 1 år. Observera att denna behandling ska pågå i 24 timmar.
- Ett annat läkemedel är Nix schampo som kan användas av barn från 6 månader.

Var noga med att följa bruksanvisningen när det gäller alla preparat.

Upprepa behandlingen efter en vecka, för då kläcks de ägg som kanske överlevt. De 2 veckorna efter den andra behandlingen ska du också lusamma varje dag för att vara säker på att alla löss är borta. Under behandlingstiden finns ingen anledning att stanna hemma från skola.

Behandla aldrig "för säkerhets skull" utan bara när det finns levande löss i hårbotten. Då är risken mindre att lössen blir motståndskraftiga (resistenta) mot det läkemedel som du använder.

Andra medel som dödar löss

Det finns också två andra medel mot löss, Hedrin och Paranix. De är inte läkemedel utan tillhör gruppen medicintekniska produkter. Hedrin och Paranix täpper till lössens andningsvägar så att de kvävs. Behandlingen skall också upprepas samt finkamning på samma sätt som med läkemedlen. Lössen kan inte bli resistenta mot dessa medel.

Kontakta skolhälsovården om ytterligare information önskas.